

# Guía Rápida de Referencia

## Signos y Síntomas de TBI para Niños de Edades de 0-4 Años

Vómito \_\_\_\_

Enfermo del Estómago \_\_\_\_

Disminución de la fuerza \_\_\_\_

Disminución de coordinación o falta de equilibrio \_\_\_\_

Disminución en chupar / tragar \_\_\_\_

Disminución de la habilidad de levantar / sostener la cabeza \_\_\_\_

Disminución en sonreír y vocalizar \_\_\_\_

Disminución en el lenguaje / comunicación \_\_\_\_

Disminución de tolerancia a la luz \_\_\_\_

Disminución del apetito \_\_\_\_

Se frota frecuentemente los ojos \_\_\_\_

Disminución de la habilidad de enfocar los ojos \_\_\_\_

Extrema irritabilidad/Aumento del llanto \_\_\_\_

Tamaño desigual de las pupilas de los ojos \_\_\_\_

Inflamación de la fontanela \_\_\_\_

Cambios en el sueño \_\_\_\_

Parece mareado o confundido \_\_\_\_

Actúa como si le duele la cabeza (dolor de cabeza) \_\_\_\_

Pérdida del conocimiento \_\_\_\_



Esta publicación está financiada en parte por la subvención # H21MC06740 del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS), la Administración de Recursos y Servicios de Salud, Oficina de Salud Materna e Infantil. Los contenidos son responsabilidad exclusiva de los autores y no la posición oficial del DHHS.